

Amita A. Desai, Rafael E. Jimenez, Tanya L. Hoskin, Courtney N. Day, Judy C. Boughey, and Tina J. Hieken

Department of Surgery, Pathology, Health Sciences Research, Mayo Clinic, Rochester, MN

## Memenin Pleomorfik İn Situ Lobüler Karsinomunda Tedavi Sonuçları

Ann Surg Oncol (2018) 25:3064–3068

<https://doi.org/10.1245/s10434-018-6591-6>

### Özet

**Giriş:** Pleomorfik lobüler karsinoma in situ (PLKİS) nadir görülen, klasik lobüler ve duktal in situ morfolojik özelliklerini paylaşan yüksek gradlı in situ bir lezyondur. Saf PLKİS'in doğal seyri ile ilgili veri sınırlı olup tedavi konusunda da kabul görmüş kanıta dayalı konsensüs rehberi bulunmamaktadır.

**Metot:** Kurumsal prospektif olarak oluşturulmuş meme cerrahisi ve patoloji veri tabanından 2004-2017 tarihleri arası kor biyopsi veya cerrahi eksizyon sonrası tanısı PLKİS olan hastalar tespit edildi. Hasta, tümör, tedavi ve sonuç verileri kanser tespiti ve tedavi sonuçları açısından değerlendirildi.

**Bulgu:** Saf PLKİS olan 18 hasta tespit edildi. 15'i kor biyopsi, 22'si kor biyopside atipi nedeni ile ameliyat sonrası, 1'i ise kor biyopsi yapılmadan eksizyonel biyopsi uygulanan hastada bulundu. Kor biyopside PLKİS tanısı alan 15 hastadan 3'ünün (%20) cerrahi eksizyon sonrası invaziv meme kanseri tanısı aldığı görüldü. Genel olarak, 7 hasta mastektomi (tüm cerrahi sınırlar negatif) ve 11 hasta lumpektomi (bir vakada fokal olarak pozitif marjin) ile tedavi edildi. Sekiz hasta adjuvan tedavi aldı. Hastaların altısına endokrin tedavi, birine radyoterapi ve birine ise her ikisi birden uygulandı. Kesin tanısı PLKİS olan hastalardan takipte, ikisinde ipsilateral rekürens görüldü. Bunlardan biri invaziv lobüler karsinom olup 87. ayda, diğeri ise PLKİS olup postoperatif 16. ayda gelişti.

**Sonuç:** Kor biyopside PLKİS tanısı alan hastada %20'ye varan oranda invaziv kanser olasılığı nedeni ile cerrahi eksizyon zorunludur. Sınır negatif cerrahi eksizyonda sonuçlar mükemmel olup sadece bir invaziv rekürens görülmüştür. Adjuvan tedavinin rolünün tanımlanması ve kanıta dayalı tedavi rehberlerinin oluşturulması için daha geniş vaka sayılı, daha uzun takip süreli çalışmalar gerekmektedir.